

ประกาศเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสซิกาแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศจีน

จากการรายงานขององค์การสุขภาพอนามัยโลก (WHO) เดือนพฤษภาคม 2558 ประเทศบราซิล ประกาศพบผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสซิกาเคสแรก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 WTO ประกาศว่า โรคซิกาจะสืบ และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทในทารกแรกเกิด อาจมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการระบาดของ เชื้อไวรัสซิกา จนกลายมาเป็น “เหตุการณ์ด้านสุขภาพอนามัยสาธารณะที่ทั่วโลกจับตามอง” จนถึง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี 36 ประเทศ (ภูมิภาค) ในทวีปอเมริกา เอเชีย โอเชียเนีย และ แอฟริกา เป็นต้น รายการการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ นับจนถึงขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสซิกาทั่วโลกกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดข้ามประเทศเพิ่มสูงขึ้น หลายประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือมีรายงานการพบเคสของโรคนี้ที่เกิดจากการแพร่ระบาด เข้ามาสู่ภายในประเทศ ส่วนจีนแผ่นดินใหญ่พบ 10 เคสที่เกิดจากการแพร่ระบาดเข้ามาสู่ ภายในประเทศ ขณะเดียวกัน ได้หวั่นมีรายงานว่าพบ 1 เคสเช่นกัน ในเดือนธันวาคม 2558 กระทรวง ควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้ออกประกาศ เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสซิกาแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศจีน จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสซิกาในแต่ละประเทศ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา เข้ามายัง ประเทศจีน อาศัยความใน “กฎหมายว่าด้วยการกักกันโรคชายแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน” และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง “กฎระเบียบด้านมาตรการฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์ด้านสุขภาพ สาธารณะฉับพลัน” และ “กฎสุขภาพระหว่างประเทศ (2005)” จึงขอประกาศเพื่อทราบ ดังนี้

1. บุคคลที่เดินทางมาจากประเทศ (ภูมิภาค) ที่มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคนี้ หากมีอาการตัว ร้อน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อ หรือมีผื่นแดง เป็นต้น เมื่อเข้าออกประเทศต้องแจ้ง ให้หน่วยงานด้านการตรวจสอบกักกันการเข้าออกประเทศ (CIQ) ทราบด้วยวาจาทันที หากเข้ามา ในประเทศแล้ว มีอาการดังกล่าวต้องเข้ารับการรักษาทันที และแจ้งประวัติการเดินทางล่าสุดให้ แพทย์ทราบ เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและรักษาได้ทันเวลาที่
2. บุคคลที่เดินทางมาจากประเทศ (ภูมิภาค) ดังกล่าว ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน CIQ ในการ ตรวจวัดอุณหภูมิ ชักประวัติ สำนวนด้านโรคระบาด และการตรวจสอบทางการแพทย์ ขณะเดียวกัน หน่วยงาน CIQ ต้องเตรียมสารเคมีที่ใช้ทดสอบเชื้อไวรัสซิกา ทำการตรวจวินิจฉัย และตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ทำการตรวจสอบคัดแยกบุคคลที่มา แจ้งด้วยตนเอง หรือตรวจพบอาการตัวร้อน ปวดศีรษะและมีผื่นแดง เป็นต้น แล้วเก็บตัวอย่าง เพื่อส่งวิเคราะห์ตามกฎระเบียบ และใช้มาตรการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง หากพบผู้ป่วยหรือ ต้องสงสัยว่าป่วย ให้หน่วยงานทางการแพทย์ที่กำหนดทำการรักษาในขั้นต่อไป โดยหน่วยงาน ควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่ต้องทำการสืบสวนติดตาม หากตรวจพบว่าป่วยด้วยเชื้อไวรัสซิกาจาก การแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศ ให้รายงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทันที
3. ยานพาหนะและตู้สินค้าที่มาจากประเทศ (ภูมิภาค) ดังกล่าวต้องผ่านการกำจัดอย่างมี ประสิทธิภาพ หากไม่มีหลักฐานยืนยันถึงการกำจัดฯ ให้กำกับดูแลการกำจัดฯทันที โดย หน่วยงาน CIQ ต้องทำการกักกันยานพาหนะ สินค้า ตู้สินค้า สัมภาระ และพัสดุไปรษณีย์อย่าง เข้มงวด
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด่าน ต้องใช้มาตรการกำจัดฯที่มีประสิทธิภาพ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

เพื่อปริมาณยุงภายในด่าน โดยหน่วยงาน CIQ ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลด้าน
สุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาจากยุงในด่าน

5. บุคคลที่จะเดินทางไปยังประเทศ (ภูมิภาค) ดังกล่าว ควรปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซิกา กับ
หน่วยงาน CIQ หรือศูนย์สุขภาพการเดินทางระหว่างประเทศในสังกัด หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ
AQSIQ (<http://www.aqsiq.gov.cn>) เข้าไปที่คอลัมน์การกักกันสุขอนามัย หรือเว็บไซต์ศูนย์
ควบคุมป้องกันโรคแห่งชาติจีน (<http://www.chinacdc.cn/>) เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพิ่ม
ความตระหนักในการป้องกันโรค ป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกา และขอแนะนำให้สตรีมีครรภ์
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศ (ภูมิภาค) ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา
6. โรคจากเชื้อไวรัสซิกา (Zika) เป็นโรคระบาดชนิดฉับพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสซิกา แพร่ระบาดโดย
การถูกยุงลายบ้านกัด อาการของโรคคือ มีตัวร้อน ผดผื่น ปวดข้อต่อ หรือเยื่อตาอักเสบ ซึ่ง
เกิดขึ้นหลังจากที่โดนยุงกัด 3 – 12 วัน 80% ของผู้ป่วยอาจจะไม่ปรากฏอาการของโรค แต่ผู้ที่
ได้รับเชื้อมักจะมีอาการเล็กน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 2 – 7 วัน น้อยรายที่จะถึงแก่ชีวิต อาการ
ของโรคมักจะคล้ายกับโรคไข้เลือดออกที่มีสาเหตุจากยุง WHO รายงานว่า อาการศีรษะสับสนผิดปกติ
ในทารกแรกเกิด และโรค Guillain-Barre's syndrome อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อ
ไวรัสซิกา โดยเชื้อไวรัสซิกาอาจอาศัยยุงลายบ้านเป็นพาหะในการแพร่ระบาด ดังนั้น จึงควรดูแล
ป้องกันตนเอง ลดการถูกยุงกัด

ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป มีอายุ 12 เดือน

เอกสารแนบ รายชื่อประเทศ (ภูมิภาค) ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา

กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค กระทรวงรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
กระทรวงคมนาคมและการขนส่ง กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการสุขอนามัยและการคุมกำเนิดแห่งชาติ
สำนักงานศุลกากร สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติจีน

2 มีนาคม 2559

เอกสารแนบ

รายชื่อประเทศ (ภูมิภาค) ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา (รวม 40 ประเทศ นับถึงวันที่ 26 ก.พ.59)

ทวีปอเมริกา (31) ได้แก่ Aruba, Bonaire, Barbados, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica,
Curacao, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guadeloupe,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Puerto Rico, French Saint Martin, Sint Maarten, Saint Vincent and the Grenadines,
Suriname, Virgin Islands, Venezuela และ Trinidad and Tobago

ทวีปโอเชียเนีย (6) ได้แก่ American Samoa, Samoa, Solomon islands, Marshall Islands, Tonga
และ Vanuatu

ทวีปเอเชีย (2) ได้แก่ ประเทศมัลดีฟส์ และ ประเทศไทย

ทวีปแอฟริกา (1) ได้แก่ Cape Verde